



Effets néfastes d'un piercing buccal

Les piercings effectués sur la joue, la lèvre ou la langue ne sont pas anodins...

Dangers potentiels...

- Infection locale (enflure et gonflement, écoulement de pus, fièvre, verrue, herpès, etc...);
- Infection systémique (tétanos, VIH, hépatites B et C, etc...);
- Choc toxique (empoisonnement, réaction allergique au métal commun, etc...);
- Transmission des bactéries par le sang pouvant atteindre le cœur, les reins, le cerveau, etc...;
- Lésion tumorale à plus long terme par frottements répétitifs du piercing sur les lèvres, joues, gencives, etc...

Autres conséquences :

- Saignement, hémorragie ;
- Douleur, enflure et gonflement occasionnant de la difficulté à respirer, à avaler, à parler, à mastiquer ;
- Augmentation de la salive ;
- Sensibilité au chaud, aux aliments épicés, etc. ;
- Perte de goût ;
- Kyste ou déchirure ;
- Mauvaise haleine continue ;
- Perte de sensibilité (si un nerf est atteint) ou sensation désagréable d'engourdissement, de picotement ;
- Bris du bijou et risque de l'avaler ou de l'aspirer dans les voies respiratoires.

Conséquences au niveau des dents

- Dent usée par le frottement du bijou ;
- Dent fêlée ou cassée, ou obturation fissurée, par les chocs répétitifs du métal en mangeant, en se mordant et en dormant ;
- Irritation, gonflement, saignement de la gencive ;
- Déchaussement irréversible de la gencive entraînant sensibilité et possibilité de carie de racine (une gencive déchaussée le reste toujours, sauf à envisager le recours à une greffe de gencive).