

## Les élastiques inter-maxillaires sur les appareils multi-attaches

En fonction des cas, il peut être parfois envisagé de **positionner des élastiques intermaxillaires tendus entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure.**

Ces élastiques exercent une force plus ou moins élevée (en fonction du type d'élastiques prescrit par votre Spécialiste) qui permet de **faciliter le déplacement des dents.**

Il est important de savoir que ces dispositifs sont également placés selon un schéma très précis pour exercer une force mesurée et faire bouger les dents dans la direction désirée.



Si des élastiques ont été ajoutés à votre appareil dentaire multi-attaches pour que vos dents se déplacent dans la direction donnée par leur positionnement, votre Spécialiste vous fournit un stock d'élastiques et vous explique **COMMENT et OU les accrocher.**

Après la pose en bouche, les élastiques vont vous **gêner durant les premiers jours qui suivent**, ensuite vous allez vous habituer, comme à chaque étape de votre traitement.

### Port des élastiques intermaxillaires :

- Portez vos élastiques **JOUR et NUIT**
- **Retirez les pendant les repas et le brossage des dents**, et n'oubliez pas de **les remettre aussitôt après !**
- **Changez les élastiques UNE SEULE FOIS PAR JOUR** (neufs)
- **Surveillez votre stock d'élastiques** : vous ne devez pas en manquer

### **Une journée sans élastique = une semaine de perdue !**

Si vous ne portez pas les élastiques intermaxillaires prescrits par votre Spécialiste, vos dents ne se déplaceront pas ; votre traitement n'avancera pas et durera bien plus longtemps.

Si vous portez irrégulièrement les élastiques intermaxillaires prescrits par votre Spécialiste, vos dents reviennent à chaque fois à leur place d'origine.